

**RESSECÇÃO DE LIPOMA NA REGIÃO SUBMANDIBULAR DIREITA:
relato de caso**

Kleyciane Kévilin Pereira da Silva¹

Bruna Heloísa Costa Varela Ayres de Melo²

Viviane de Albuquerque Azevedo Salvador³

Marcela Côrte Real Fernandes⁴

Rodrigo Henrique Mello Varela Ayres de Melo⁵

Ricardo Eugenio Varela Ayres de Melo⁶

1 INTRODUÇÃO

Lipoma é um tumor benigno de origem mesenquimal com etiologia incerta, localizado na camada gordurosa ou sub muscular, sendo composto por de tecido adiposo. Seu metabolismo é totalmente independente da gordura corporal e possui predileção por homens, entre os 50 e 70 anos de idade, sendo a região de tronco e extremidades os sítios mais comuns. Clinicamente, apresenta-se como lesão bem circunscrita, móvel, macia à palpação, indolor e de base séssil ou pedunculada, de coloração amarelada quando são lesões mais superficiais e rosada quando mais profunda. O diagnóstico é majoritariamente clínico com a confirmação por meio de análise histopatológica e por exames de imagens, ao qual o tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica conservadora.

¹ Acadêmica do curso de Odontologia do Centro Universitário Facol (UNIFACOL). E-mail: kleyciane88@hotmail.com.

² Acadêmico do curso de Odontologia da UNINASSAU – Rio Grande do Norte. E-mail: brunavaayres@hotmail.com.

³ Acadêmica do curso de Odontologia do Centro Universitário Facol (UNIFACOL). E-mail: vivianealq@gmail.com.

⁴ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife – PE, Brasil. E-mail: marcela.cortereal@gmail.com.

⁵ Médico da Sociedade Sulina Divina Providência; Médico da Fundação de Saúde Novo Hamburgo – Rio Grande do Sul. E-mail: rodrigoayres@msn.com.

⁶ Coordenador do curso de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial pela Universidade Federal de Pernambuco, revamelo@yahoo.com.

2 OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivo relatar o caso de tratamento cirúrgico de lipoma extenso na região submandibular em uma paciente do sexo feminino, 67 anos de idade, que apresentava aumento de volume na região submandibular direita, com 5 anos de evolução.

3 RELATO DE CASO

Ao exame clínico, apresentou lesão bem delimitada, móvel, macia à palpação e indolor. Foi preconizada a realização de uma biopsia excisional. Sob anestesia geral, realizou-se a incisão submandibular de Risdon, divulsão dos tecidos subcutâneos e hemostasia dos vasos sangrantes. A cirurgia seguiu com a ressecção da lesão, toailete da cavidade e sutura por planos. A peça patológica foi encaminhada para o Serviço de Anatomopatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, medindo 14cm x 6,5cm, com confirmação da hipótese de Lipoma.

4 DISCUSSÃO

Os lipomas de cabeça e pescoço, devido à complexidade anatômica da região, podem se desenvolver em zonas de perigo da face envolvendo veias, artérias e nervos importantes que podem ser lesionados na cirurgia. No caso relatado, realizou-se a demarcação de pontos de orientação para evitar lesionar o ramo mandibular do nervo facial e a incisão de Risdon foi realizada visando à preservação do ramo de Jaffé.

5 CONCLUSÃO

Portanto, mesmo que não muito frequentes na região de cabeça e pescoço, cabe ao Cirurgião Buco Maxilo Facial conhecer as características desse tipo de patologia, bem como o manejo adequado. O tratamento de escolha foi ressecção cirúrgica total da lesão por apresentar um prognóstico favorável e evitar recidivas. O acesso submandibular de Risdon demonstrou-se como boa opção para lesões na região cervical, pois quando realizado de

maneira adequada, evita lesões a estruturas anatômicas importantes da região, além de apresentar um resultado estético satisfatório. O caso foi acompanhado por seis anos onde a paciente apresentou bom resultado estético e funcional sem recidiva, assegurando a eficácia do tratamento proposto.

REFERÊNCIAS

ABAJO, B. M. *et al.* *Lipomas: classification, dermatologic manifestations and treatment. International Journal of Cancer Research and Prevention*, v. 9, n. 2, p. 125, 2016.

BOYER, M. *et al.* *A review of techniques and procedures for lipoma treatment. Clinic Dermatol.*, v. 3, n. 4, p. 105-112, 2015.

NEVILLE, B. W. *et al.* *Patologia das Glândulas Salivares. In: NEVILLE, B. W. et al. Patologia Oral e Maxilofacial.* 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.